

## ANTE LA SITUACION DE LLUVIAS QUE HA IMPEDIDO HASTA AHORA LA SIEMBRA DE BUENA PARTE DE LA REMOLACHA

### AIMCRA RECOMIENDA

**LABORES:** no se precipite, realice las labores en buenas condiciones. Es mejor retrasar unos días la siembra que realizar labores con excesiva humedad.

**SIEMBRA:** siembre a la distancia recomendada, 14 a 16 cm entre semillas y 1 a 2 cm de profundidad.

**VARIEDADES:** utilice una variedad recomendada y protegida con insecticida. En caso de parcelas con antecedentes de pudriciones por *rhizoctonia*, valore la utilización de variedades recomendadas tolerantes a *rhizoctonia*.

**HERBICIDAS:** realice la aplicación de preemergencia inmediatamente después de sembrar y **no se descuide con las aplicaciones de postemergencia**, es previsible que por estar en fechas más avanzadas, el calor acelere el desarrollo de las malas hierbas, haciéndose necesario acortar el intervalo entre aplicaciones.

**RIEGO:** mantenga la humedad superficial del suelo para facilitar el nacimiento y mejorar la acción de los herbicidas. Para evitar que el suelo se apriete y cree corteza, deberá dar riegos de nascencia, cortos pero diarios.

NO SE PRECIPITE, ESTAMOS A TIEMPO DE CONSEGUIR UNA GRAN COSECHA DE REMOLACHA, Y ADEMÁS ESTE AÑO EL RIEGO ESTÁ ASEGURADO

## SI USTED HA SEMBRADO ANTES DE LAS LLUVIAS Y HA TENIDO PROBLEMAS DE NASCENCIA POR EL MAL TIEMPO Y LAS HELADAS

### AIMCRA RECOMIENDA

No se precipite a resembrar. Con 45.000 a 50.000 plantas/ha bien distribuidas **NO DEBE RESEMBRAR**. Si las plantitas están dañadas y tiene dudas sobre su evolución, deles una semana de plazo, cuéntelas, márkuelas y al cabo de 7 días tome la decisión.

Para valorar la nascencia hágalo en al menos 10 puntos de la parcela, en cada punto cuente las plantas de 10 metros lineales y multiplique por 2.000 (25 plantas en 10 metros equivalen a  $25 \times 2.000 = 50.000$  plantas/ha). Si se decide usted a resembrar, vuelva a aplicar los herbicidas de preemergencia y continúe como en una siembra normal.

